

## AGREE vurdering af kliniske retningslinjer for patienter med cervical radikulopati

I alt tre kliniske retningslinjer blev udvalgt til AGREE vurdering. Ingen af disse kunne bruges til at svare tilstrækkeligt på de valgte fokuserede spørgsmål. Selvom disse retningslinjer ikke indgik direkte denne nationale kliniske retningslinjer, har de indgået som inspiration til litteratursøgning og deres referencelister er blevet set igennem for systematiske oversigtsartikler og primær litteratur.

Reference	Samlede vurdering	Rigour vurdering (Domæne 3)	Anvendes i NKR?
National Guideline C. Neck and upper back (acute & chronic) Rockville MD: Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ); [9/27/2014]. Available from: <a href="http://www.guideline.gov/content.aspx?id=47589">http://www.guideline.gov/content.aspx?id=47589</a> .	5 - 3	1 - 6 (konsensus 5)	Nej
Childs JD, Cleland JA, Elliott JM, Teyhen DS, Wainner RS, Whitman JM, et al. Neck pain: Clinical practice guidelines linked to the International Classification of Functioning, Disability, and Health from the Orthopedic Section of the American Physical Therapy Association. J Orthop Sports Phys Ther. 2008;38(9):A1-A34.	4 - 5	4 - 5	Nej
Bono CM, Ghiselli G, Gilbert TJ, Kreiner DS, Reitman C, Summers JT, et al. An evidence-based clinical guideline for the diagnosis and treatment of cervical radiculopathy from degenerative disorders. Spine J. 2011;11(1):64-72.	5 - 5	7 - 6	Nej