

Opstart af nyt antidiabetikum før og efter opdatering af National Rekommandationsliste

Tid	Halvår*	Lægemiddelgruppe	ATC	ATC-tekst	Antal personer
Før NRL	Før NRL II	DDP-4-hæmmere	A10BD07	Metformin og sitagliptin	1.003
Før NRL	Før NRL II	DDP-4-hæmmere	A10BD08	Metformin og vildagliptin	539
Før NRL	Før NRL II	DDP-4-hæmmere	A10BD10	Metformin og saxagliptin	<5
Før NRL	Før NRL II	DDP-4-hæmmere	A10BD11	Metformin og linagliptin	9
Før NRL	Før NRL II	DDP-4-hæmmere	A10BD13	Metformin og alogliptin	38
Før NRL	Før NRL II	DDP-4-hæmmere	A10BH01	Sitagliptin	1.550
Før NRL	Før NRL II	DDP-4-hæmmere	A10BH02	Vildagliptin	193
Før NRL	Før NRL II	DDP-4-hæmmere	A10BH03	Saxagliptin	23
Før NRL	Før NRL II	DDP-4-hæmmere	A10BH04	Alogliptin	112
Før NRL	Før NRL II	DDP-4-hæmmere	A10BH05	Linagliptin	725
Før NRL	Før NRL II	Glitazoner	A10BG03	Pioglitazon	14
Før NRL	Før NRL II	GLP-1-analoger	A10BJ01	Exenatid**	5
Før NRL	Før NRL II	GLP-1-analoger	A10BJ02	Liraglutid	1.767
Før NRL	Før NRL II	GLP-1-analoger	A10BJ05	Dulaglutid	257
Før NRL	Før NRL II	Kombinationsmidler	A10BD21	Saxagliptin og dapagliflozin	27
Før NRL	Før NRL II	SGLT2-hæmmere	A10BD15	Metformin og dapagliflozin	103
Før NRL	Før NRL II	SGLT2-hæmmere	A10BD20	Metformin og empagliflozin	328
Før NRL	Før NRL II	SGLT2-hæmmere	A10BK01	Dapagliflozin	1.341
Før NRL	Før NRL II	SGLT2-hæmmere	A10BK02	Canagliflozin	31
Før NRL	Før NRL II	SGLT2-hæmmere	A10BK03	Empagliflozin	3.021
Før NRL	Før NRL II	β-cellestimulerende midler	A10BB01	Glibenclamid	9
Før NRL	Før NRL II	β-cellestimulerende midler	A10BB03	Tolbutamid	<5
Før NRL	Før NRL II	β-cellestimulerende midler	A10BB07	Glipizid	14
Før NRL	Før NRL II	β-cellestimulerende midler	A10BB09	Gliclazid	146
Før NRL	Før NRL II	β-cellestimulerende midler	A10BB12	Glimepirid	965
Før NRL	Før NRL II	β-cellestimulerende midler	A10BX02	Repaglinid	20
Før NRL	Før NRL I	DDP-4-hæmmere	A10BD07	Metformin og sitagliptin	1.010
Før NRL	Før NRL I	DDP-4-hæmmere	A10BD08	Metformin og vildagliptin	603
Før NRL	Før NRL I	DDP-4-hæmmere	A10BD10	Metformin og saxagliptin	<5
Før NRL	Før NRL I	DDP-4-hæmmere	A10BD11	Metformin og linagliptin	15
Før NRL	Før NRL I	DDP-4-hæmmere	A10BD13	Metformin og alogliptin	42
Før NRL	Før NRL I	DDP-4-hæmmere	A10BH01	Sitagliptin	1.798
Før NRL	Før NRL I	DDP-4-hæmmere	A10BH02	Vildagliptin	234
Før NRL	Før NRL I	DDP-4-hæmmere	A10BH03	Saxagliptin	37
Før NRL	Før NRL I	DDP-4-hæmmere	A10BH04	Alogliptin	131
Før NRL	Før NRL I	DDP-4-hæmmere	A10BH05	Linagliptin	756
Før NRL	Før NRL I	Glitazoner	A10BG03	Pioglitazon	15
Før NRL	Før NRL I	GLP-1-analoger	A10BJ01	Exenatid**	6
Før NRL	Før NRL I	GLP-1-analoger	A10BJ02	Liraglutid	1.813

Før NRL	Før NRL I	GLP-1-analoger	A10BJ05	Dulaglutid	261
Før NRL	Før NRL I	Kombinationsmidler	A10BD09	Pioglitazon og alogliptin	<5
Før NRL	Før NRL I	Kombinationsmidler	A10BD21	Saxagliptin og dapagliflozin	9
Før NRL	Før NRL I	SGLT2-hæmmere	A10BD15	Metformin og dapagliflozin	90
Før NRL	Før NRL I	SGLT2-hæmmere	A10BD16	Metformin og canagliflozin	<5
Før NRL	Før NRL I	SGLT2-hæmmere	A10BD20	Metformin og empagliflozin	310
Før NRL	Før NRL I	SGLT2-hæmmere	A10BK01	Dapagliflozin	1.369
Før NRL	Før NRL I	SGLT2-hæmmere	A10BK02	Canagliflozin	43
Før NRL	Før NRL I	SGLT2-hæmmere	A10BK03	Empagliflozin	2.892
Før NRL	Før NRL I	β-cellestimulerende midler	A10BB01	Glibenclamid	20
Før NRL	Før NRL I	β-cellestimulerende midler	A10BB03	Tolbutamid	<5
Før NRL	Før NRL I	β-cellestimulerende midler	A10BB07	Glipizid	11
Før NRL	Før NRL I	β-cellestimulerende midler	A10BB09	Gliclazid	120
Før NRL	Før NRL I	β-cellestimulerende midler	A10BB12	Glimepirid	1.145
Før NRL	Før NRL I	β-cellestimulerende midler	A10BX02	Repaglinid	28
Efter NRL	Efter NRL	DDP-4-hæmmere	A10BD07	Metformin og sitagliptin	1.052
Efter NRL	Efter NRL	DDP-4-hæmmere	A10BD08	Metformin og vildagliptin	507
Efter NRL	Efter NRL	DDP-4-hæmmere	A10BD11	Metformin og linagliptin	13
Efter NRL	Efter NRL	DDP-4-hæmmere	A10BD13	Metformin og alogliptin	32
Efter NRL	Efter NRL	DDP-4-hæmmere	A10BH01	Sitagliptin	1.759
Efter NRL	Efter NRL	DDP-4-hæmmere	A10BH02	Vildagliptin	210
Efter NRL	Efter NRL	DDP-4-hæmmere	A10BH03	Saxagliptin	20
Efter NRL	Efter NRL	DDP-4-hæmmere	A10BH04	Alogliptin	95
Efter NRL	Efter NRL	DDP-4-hæmmere	A10BH05	Linagliptin	702
Efter NRL	Efter NRL	Glitazoner	A10BG03	Pioglitazon	10
Efter NRL	Efter NRL	GLP-1-analoger	A10BJ01	Exenatid**	11
Efter NRL	Efter NRL	GLP-1-analoger	A10BJ02	Liraglutid	2.230
Efter NRL	Efter NRL	GLP-1-analoger	A10BJ05	Dulaglutid	239
Efter NRL	Efter NRL	Kombinationsmidler	A10BD21	Saxagliptin og dapagliflozin	33
Efter NRL	Efter NRL	SGLT2-hæmmere	A10BD15	Metformin og dapagliflozin	161
Efter NRL	Efter NRL	SGLT2-hæmmere	A10BD20	Metformin og empagliflozin	347
Efter NRL	Efter NRL	SGLT2-hæmmere	A10BK01	Dapagliflozin	1.580
Efter NRL	Efter NRL	SGLT2-hæmmere	A10BK02	Canagliflozin	70
Efter NRL	Efter NRL	SGLT2-hæmmere	A10BK03	Empagliflozin	3.749
Efter NRL	Efter NRL	β-cellestimulerende midler	A10BB01	Glibenclamid	12
Efter NRL	Efter NRL	β-cellestimulerende midler	A10BB07	Glipizid	9
Efter NRL	Efter NRL	β-cellestimulerende midler	A10BB09	Gliclazid	177
Efter NRL	Efter NRL	β-cellestimulerende midler	A10BB12	Glimepirid	931
Efter NRL	Efter NRL	β-cellestimulerende midler	A10BX02	Repaglinid	16

Antal personer, der i perioden november 2016-april 2018 opstarter et lægemiddel i lægemiddelgrupperne 1) DDP-4-hæmmere, 2) glitazoner, 3) GLP-1-analoger, 4) kombinationer, 5) SGLT2-hæmmere og 6) beta-cellestimulerende lægemidler fordelt på lægemiddel. Afgrænsningerne af de respektive lægemiddelgrupper fremgår af fanen 'Koder'.

Der er diskretioneret ved antal personer under 5.

-Der er <5 personer, der på opstartsdato har indløst recept på DDP-4-hæmmere som enkeltkomponent og i kombination med metformin. Disse personer tæller dermed med to gange i gruppen. Det drejer sig om indholdsstofferne sitagliptin og alogliptin.

Også for SGLT2-hæmmerne er der 5 personer, der på opstartsdato får to forskellige lægemidler indenfor samme lægemiddelgruppe ved første receptindløsning. Her kan de indløse recept på en SGLT2-hæmmer i kombination med metformin og samme SGLT2-hæmmer som enkeltkomponent, men det kan også være to forskellige SGLT2-hæmmere som enkeltkomponenter. De tæller dermed med to gange ved optælling på ATC-niveau. Dette er relevant for indholdsstofferne empagliflozin, dapagliflozin samt kombinationslægemidlet med dapagliflozin og metformin.

- Udover ovenstående tilfælde, hvor en person tæller med to gange indenfor én lægemiddelgruppe, vil hver person i de øvrige lægemiddelgrupper kun tælle med én gang. Dog kan en person tælle med flere gange i opgørelsen, hvis denne opstarter ny behandling i flere lægemiddelgrupper i den angivne tidsperiode. Der er i alt 34.763 unikke personer med i datasættet, og nogle af disse vil som sagt tælle med flere gange.

*Der er tre værdier for variablen halvår: 'Før NRL I' gælder for perioden november 2016-april 2017, 'Før NRL II' for perioden maj 2017-oktober 2017, mens 'Efter NRL' gælder for 'november 2017-april 2018'.

**Grundet det lave forbrug er exenatid ikke opdelt i forhold til ikke-depot og depot.

Kilde: Sundhedsdatastyrelsen, Lægemiddelstatistikregistret (opdateret til 30. april 2018).